

MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) EN RPA : GASTRO-ENTÉRITE

UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unité de type RI dans une RPA ➤ Unité de type mixte dans une RPA, c'est-à-dire comprenant à la fois des places de type RI et des places de type RPA mélangées ensemble ➤ Unité prothétique 	
HORS UNITÉ DE SOINS	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tout autre milieu 	
SYMPTÔMES ET CONTAGIOSITÉ	
Symptôme clinique compatible avec la gastro-entérite	<p>Apparition soudaine en 24h d'au moins :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 épisodes de vomissements <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 épisodes de selles molles ou liquides de plus que ce qui est considéré comme normal pour le résident <p>ET</p> <p>Au moins un symptôme :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fièvre ➤ Nausée ➤ Crampes abdominales ➤ Céphalée
Période de contagiosité	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dès l'apparition des symptômes jusqu'à 48h après la fin des symptômes
PRISE EN CHARGE D'UNE PERSONNE SYMPTÔMATIQUE	
Dépistage	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tester pour COVID-19, toutes les personnes symptomatiques afin d'éliminer ce diagnostic <ul style="list-style-type: none"> ○ Si suspicion de COVID-19 appliquer les précautions additionnelles pour COVID-19 (masque type N-95, protection oculaire, jaquettes, gants)
Unité de soins ET Hors unité de soins	<p>Garder le résident à sa chambre avec les précautions additionnelles gouttelettes-contact (masque médical, jaquette et gants)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Maintenir l'isolement jusqu'à 48h après la fin des symptômes
Retrait du travail Travailleur ET Manipulateur d'aliment	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retirer immédiatement tout travailleur et manipulateur d'aliment malade <ul style="list-style-type: none"> ○ Jusqu'à 48h après la fin des symptômes
Contacts étroits	<p>Unité de soins :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Co-chambreaux et personnes qui ont partagé la même toilette <ul style="list-style-type: none"> ○ Isolement gouttelettes-contact à la chambre pour 48h ○ Surveillance des symptômes pour 48h
	<p>Hors unité de soins : Aucune mesure pour les contacts étroits</p>

MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) EN RPA : GASTRO-ENTÉRITE

MILIEU EN ÉCLOSION	
Deux résidents ou plus dans l'unité de soins, la résidence ou secteur à l'intérieur de 48h	
Communication	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informer l'ensemble du personnel, les résidents, les familles et visiteurs de l'état de situation et des mesures qui seront en place ➤ Afficher à l'entrée du milieu de vie qu'une éclosion est en cours ➤ Lors d'un transfert de résident, aviser le centre receveur que le milieu est en éclosion ➤ Sensibiliser les résidents à faire l'auto-surveillance des symptômes ➤ Rencontrer le personnel <ul style="list-style-type: none"> ○ Dresser un portrait de la situation ○ Rappeler l'importance de l'hygiène des mains ○ Rappeler les symptômes de gastro-entérite ○ Rappeler l'importance de respecter les procédures de désinfection des petits équipements mobiles partagés et des surfaces de travail (ex. chariot à médicament, ordinateur, téléphone, presse-pilule, espace de travail)
Mesures de prévention et contrôle des infections	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Surveiller les symptômes de tous les résidents et travailleurs ➤ Renforcer l'hygiène des mains avec solution hydro-alcoolique à 70% ou avec de l'eau et du savon <ul style="list-style-type: none"> ○ Demander aux résidents de procéder à l'hygiène des mains avant les repas, les collations et après être allé à la toilette ➤ Dédier une toilette aux personnes malades ou fournir une chaise d'aisance, favoriser l'utilisation des sacs hygiéniques ➤ Si possible, encourager les résidents à utiliser leur salle de bains personnelle ➤ Nettoyer et désinfecter les salles de bains partagées plusieurs fois par jour <p>Mobilité des travailleurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Restreindre la circulation dans l'unité ou secteur en éclosion aux TdeS requis pour les soins ➤ Assurer la stabilité des TdeS sur l'unité/secteur en éclosion ➤ Si les TdeS ne peuvent être dédiés, terminer par les soins aux résidents sur l'unité en éclosion
Salle à manger	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ajouter une personne qui accueille les résidents à la salle à manger pour faire un rappel de l'hygiène des mains ➤ Offrir l'option du service de livraison des repas à l'appartement/chambre pour réduire l'achalandage à la salle à manger
Aires communes ET Activités sociales	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Reporter les soupers mensuels des anniversaires ➤ Reporter les activités de groupe ➤ Reporter les visites porte ouverte du milieu ➤ Ajouter des distributrices de solution hydro-alcoolique dans les espaces communs avec affiches plastifiées

MESURES DE PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI) EN RPA : GASTRO-ENTÉRITE

<p>Nettoyage et désinfection</p>	<p>Mettre en place une fréquence de nettoyage et de désinfection des surfaces fréquemment touchées (<i>high touch</i>) dans les aires communes qui est supérieure à une fois par jour (plurifréquence).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Utiliser le guide Hygiène et salubrité dans les milieux de vie RPA, RI et CHSLD ➤ Établir des routes de travail afin d'augmenter les fréquences de nettoyage et de désinfection : <ul style="list-style-type: none"> ○ Avoir une liste des <i>high touch</i> à nettoyer ○ Utiliser un produit virucide et homologué (numéro DIN) par Santé Canada ○ Porter une attention particulière aux salles de bains partagées <p>Lorsque l'isolement du résident est cessé</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Procéder au nettoyage et à la désinfection complets (surfaces <i>high touch</i> et <i>low touch</i>) de la salle de toilette et de la chambre
<p>Proches aidants et visiteurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Donner accès aux équipements de protection individuelle (ÉPI) et offrir de l'assistance pour les enfiler et les retirer, au besoin ➤ Revoir les mesures de prévention des infections à l'arrivée ➤ Demander de ne pas utiliser la toilette des résidents
<p>QUAND SIGNALER L'ÉCLOSION</p> <p>Direction de santé publique ET Direction SAPA</p>	<p>Unité de soins : Dès le début de l'éclosion, c'est-à-dire à partir de 2 cas d'acquisition dans l'unité de soins en 48h</p> <p>Hors unité de soins : Lorsque les critères d'intervention de la santé publique sont atteints, c'est-à-dire :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 15% des résidents (minimum 3 résidents) OU ➤ 20 résidents sont atteints dans le secteur touché Peu importe l'intervalle de temps <p>Direction de santé publique à l'adresse suivante : maladies.infectieuses.ciessler@ssss.gouv.qc.ca ET Direction SAPA à l'adresse suivante : rpa.sapa.ciessler@ssss.gouv.qc.ca</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Compléter et envoyer le formulaire de signalement d'éclosion et la liste de cas disponible sur le site internet du CISSS des Laurentides: Outils de soutien - Gestions d'éclosion de COVID-19, d'influenza et de gastro