

Niveau de protection des usagers	
<p>Considéré protégé contre l'infection</p> <p>Excluant les personnes immunosupprimées</p>	<p>A fait un épisode de COVID-19 depuis 3 mois ou moins (vacciné ou non) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • confirmé par TAAN-labo; <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • avec TDAR positif ET histoire fiable sur l'exposition, les symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 et la date de test; <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • confirmé par lien épidémiologique : symptômes cliniques compatibles avec la COVID-19 ET exposition à risque élevé avec un cas confirmé par TAAN-labo ou avec TDAR positif.
<p>Considéré partiellement protégé contre l'infection</p>	<p>Usager répondant à <u>un</u> des critères suivants (excluant l'usager immunosupprimé) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • primovaccination complète, avec ou sans dose de rappel; <ul style="list-style-type: none"> ○ deux doses de vaccin COVID-19 ARNm ou vecteur viral ET 7 jours et plus après la deuxième dose; <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ une dose de vaccin COVID-19 Johnson & Johnson suivie d'une dose de vaccin COVID-19 ARNm ET 7 jours et plus après la deuxième dose; <ul style="list-style-type: none"> • épisode de COVID-19 confirmé par TAAN-labo depuis plus de 3 mois et 6 mois ou moins, vacciné ou non; • épisode de COVID-19 confirmé par TAAN-labo depuis plus de 6 mois et 12 mois ou moins, primovaccination incomplète.
<p>Considéré non protégé contre l'infection</p>	<p>Usager répondant à <u>un</u> des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • primovaccination incomplète; • épisode de COVID-19 confirmé par TAAN-labo depuis plus de 6 mois et 12 mois ou moins ET non vacciné; • épisode de COVID-19 confirmé par TAAN-labo depuis plus de 12 mois ET non vacciné ou primovaccination incomplète; • aucune vaccination et aucun épisode de COVID-19 confirmé par TAAN-labo; • immunosupprimé vacciné ou non, épisode antérieur de COVID-19 confirmé ou non.